

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота!

Что такое нодулярный дерматит (НД)?

Это - (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзантема) — контагиозная, транскриная инфекция оная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

Как происходит заражение?

Основным путем распространения вируса является механический перенос членистоногими различных видов. Вирус от больных животных может передаваться путем прямых и непрямых контактов, а возможно и аэрогенным путем.

Как проявляется нодулярный дерматит?

Болезнь проявляется в двух формах: острой и хронической. При острой форме у заболевшего животного резко поднимается температура тела (до 40 градусов). Снижается аппетит, усиливается слезотечение и появляются слизистые выделения из носа. Через двое суток на коже животного образуются узелки диаметром от 0,5 до 7 см и высотой до 0,5 см. Количество их может колебаться от 10 до нескольких сотен. На ощупь узелки плотные. При этом в центре каждого узелка образуется ямка. Бывает и так, что на коже животного образуются язвы. Помимо кожных образований, нодулярный дерматит крупного рогатого скота характеризуют следующие симптомы:

- Розовый цвет молока.
- Выдается болезненно, очень тяжело — по каплям.
- При нагревании молока зараженного животного приобретает желеобразный вид.

Какой ущерб может нанести болезнь?

НД крупного рогатого скота, может поражать от 5 до 100 % животных стада. При распространении заболевания, значительно снижается продуктивность животных. При этом наносится значительные убытки в связи с запретом на продажу молока, мяса, и шкур.

Как предупредить возникновение НД?

- Не приобретать животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных;
- по требованию ветеринарных специалистов предоставлять животных для проведения клинического обследования;
- регулярно проводить обработку животных и стойл препаратами от кровососущих насекомых;
- не допускать развития сырости и, как следствие, появления большого количества кровососущих насекомых в коровниках;
- оповещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретенных животных;

